Cada dos meses, y listo.

Aprende sobre CABENUVA.

CABENUVA se recibe en 2 inyecciones administradas por un proveedor de salud. Tu tratamiento comienza con 2 meses consecutivos de inyecciones. Es importante asistir a todas las citas.

Las personas que aparecen viven con VIH y han sido recompensadas por ViiV Healthcare.

¿Qué es CABENUVA?

CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar la infección por VIH 1 en personas de 12 años en adelante que pesan al menos 77 libras (35 kg) como remplazo de su medicamento actual para el VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No recibas CABENUVA si:

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Tomas determinadas medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifabutin; rifampin; rifapentine; dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

CONTINUAR

ACERCA DE CABENUVA

"Ahora que recibo mi tratamiento 6 veces al año, no me tengo que preocupar de volver a casa para tomar una pastilla".



Jayson
Veterano I Fan de la historia
Se mantiene indetectable con CABENUVA
Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA?

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

¿Por qué CABENUVA es diferente?

En vez del tratamiento para el VIH que tomas todos los días, CABENUVA es:

Un tratamiento inyectable que puedes recibir una vez al mes o cada dos meses

Un tratamiento completo de acción prolongada para el VIH

Un tratamiento que ha demostrado ayudar a mantener a las personas indetectables* hasta por dos meses, dependiendo del plan de tratamiento

*Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio (menos de 50 copias por mL). Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen en unos minutos. Los síntomas pueden incluir: dificultad para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (p. ej., espalda y pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de aturdimiento o desmayo; cambios en la presión arterial.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS CONTINUAR

¿Podría CABENUVA ser una buena opción para ti?

Si eres indetectable, considera lo siguiente:

- ¿Cuáles son tus retos al tomar pastillas para el VIH todos los días?
- ¿Qué significaría para ti cambiar a un tratamiento de acción prolongada?
- ¿Puedes comprometerte con las citas de tratamiento regularmente?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Problemas hepáticos.** Las personas con antecedentes del virus de la hepatitis B o C, o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. También han ocurrido problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, similar al color del té; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

más información en la página 16

¿Cómo funciona CABENUVA?

Contiene 2 medicinas para el VIH, cabotegravir y rilpivirine, para ayudar a mantenerte indetectable*.

Estas 2 medicinas se liberan lentamente para mantener el mismo nivel del medicamento en tu cuerpo hasta la siguiente cita.



*Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si tienes alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

CITA PERIÓDICA

"CABENUVA me da flexibilidad. Realmente funciona con mi horario".

Orlando
Organizador de eventos I Experto en moda
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

Mira la siguiente página para aprender a programar tu tratamiento periódico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección; fiebre; cansancio; dolor de cabeza; dolor en los músculos o huesos; náuseas; problemas para dormir; mareo; erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

más información en la página 16

Un plan flexible de tratamiento para el VIH

Las inyecciones de CABENUVA pueden ser administradas por un profesional de la salud una vez al mes o cada dos meses, según tu plan de tratamiento.

Para ayudar a mantenerte indetectable, es importante ir a todas tus citas planeadas.

Día de Tratamiento Planeado

- Tú y tu médico elegirán el día que mejor funcione para asistir a tus citas periódicas y recibir tu tratamiento inyectable
- Si no puedes ir a tu cita, asegúrate de llamar a tu médico de inmediato

Periodo Flexible de Tratamiento

- Tienes un **Periodo Flexible de Tratamiento** para programar tu cita, que abarca desde 7 días antes y hasta 7 días después de tu **Día de Tratamiento Planeado**



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

EFECTOS SECUNDARIOS

"Aunque todavía siento un poco de dolor después de mis citas, ya estoy acostumbrado y, la verdad, no me molesta mucho".

En los estudios clínicos, las reacciones en el lugar de la inyección fueron los efectos secundarios más comunes.

Mark
Entusiasta de la naturaleza
Aventurero
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir CABENUVA (continúa)

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si: (continúa)

- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. **No amamantes si estás usando CABENUVA.** No debes amamantar si tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle el VIH 1 a tu bebé. Se desconoce si CABENUVA puede pasar al bebé a través de la leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé durante el tratamiento.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

más información en la página 17

Los efectos secundarios más comunes que se reportaron en los estudios clínicos fueron reacciones en el lugar de la inyección*†.

75% a 83% de las personas experimentaron reacciones en el lugar de la inyección.

La mayoría de las reacciones en el lugar de la inyección fueron de leves a moderadas y desaparecieron en tres días.

Menos del 4% de las personas que recibieron CABENUVA interrumpieron el tratamiento debido a algún efecto secundario‡.

Los resultados pueden variar.

*CABENUVA fue probado en 3 estudios clínicos, en los que participaron más de 2,200 adultos indetectables que cambiaron o continuaron con su tratamiento para el VIH.

†Las reacciones en el lugar de la inyección incluyen dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección.

‡4% de las personas que recibieron CABENUVA cada mes; 2% de las personas que recibieron CABENUVA cada dos meses.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

- Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informárselo a tu proveedor de salud.**

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes?

más información en la página 17

Además de las reacciones en el lugar de la inyección, los efectos secundarios más comunes incluyeron:

- Fiebre
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor en los músculos o huesos
- Náuseas
- Problemas para dormir
- Mareo
- Erupción cutánea

Estos efectos secundarios comunes ocurrieron en menos del 9% de las personas en los estudios clínicos*.

Los resultados pueden variar.

*CABENUVA fue probado en 3 estudios clínicos, en los que participaron más de 2,200 adultos indetectables que cambiaron o continuaron con su tratamiento para el VIH.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cómo se me administrará CABENUVA?

- Una vez al mes o cada dos meses, un proveedor de salud te administrará CABENUVA en 2 inyecciones (cabotegravir y rilpivirine), una en cada glúteo.
- Antes de recibir tus primeras inyecciones de CABENUVA, tu proveedor de salud podría darte a tomar 1 pastilla de VOCABRIA (cabotegravir) y 1 pastilla de EDURANT (rilpivirine) una vez al día durante un mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia a estas medicinas.
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud durante el tratamiento con CABENUVA. Es importante que asistas a las citas programadas para recibir tus inyecciones.
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de CABENUVA por más de 7 días, llama de inmediato a tu proveedor de salud para analizar tus opciones de tratamiento.
- Si interrumpes el tratamiento con CABENUVA, deberás tomar otros medicamentos para tratar tu infección por VIH 1 y reducir el riesgo de desarrollar resistencia viral. Llama a tu proveedor de salud de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

COMIENZA

"Tengo dos trabajos, por lo que el tratamiento de acción prolongada realmente funciona con mi estilo de vida".

Karen
Técnico de laboratorio
Madre orgullosa
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No recibas CABENUVA si:

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Tomas determinadas medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifabutin; rifampin; rifapentine; dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

¿Cuáles son los pasos para comenzar?

más información en la página 18

PASO 1

Verifica la cobertura y el costo

Si te recetan CABENUVA, el consultorio de tu médico y ViiVConnect pueden ayudarte a confirmar los gastos que pagarás de tu bolsillo para que puedas comenzar tu cambio a CABENUVA.

PASO 2

Prepárate para tu plan de tratamiento

Tú y tu médico elegirán tu Día de Tratamiento Planeado. Este será el día de tus citas de inyección de ahora en adelante. A continuación, programarán tu primera cita de inyección. Antes de comenzar con tus inyecciones, podrías tomar alrededor de 1 mes de pastillas de inicio para ver cómo reacciona tu cuerpo.

PASO 3, ¡y listo!

Comienza CABENUVA de acción prolongada

Recibirás tus inyecciones el Día de Tratamiento Planeado o alrededor de esa fecha de acuerdo con tu plan de tratamiento. Es importante que cumplas con todas las citas para ayudarte a mantenerte indetectable*.

*Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio. Los resultados pueden variar.

Comienza ahora

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA?

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

¿Cómo puedes aprender más sobre cómo comenzar?

¡Ve nuestro video paso a paso!

Comenzar con CABENUVA es algo nuevo, por eso creamos un video especial para guiarte a través del:
Paso 1, Paso 2, Paso 3, ¡y listo!

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen en unos minutos. Los síntomas pueden incluir: dificultad para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (p. ej., espalda y pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de aturdimiento o desmayo; cambios en la presión arterial.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ViiVConnect

más información en la página 18

¿Puedo obtener ayuda para pagar CABENUVA?

Si te recetan CABENUVA, el consultorio de tu médico y ViiVConnect pueden ayudarte a comenzar con el cambio.

Si calificas, tu copago podría ser de tan solo $0*.

Una vez que tu médico te recete CABENUVA, puedes inscribirte en ViiVConnect para obtener apoyo:

- Ayuda para navegar el proceso del seguro
- Averigua si calificas para los programas de ahorros y asistencia y ayuda disponibles

Para más información:

Visita ViiVConnect.com o llama al 1-844-588-3288 (línea gratuita), lunes-viernes, 8AM-11PM (ET). Disponible en español.

*Sujeto a elegibilidad, a los términos y condiciones del programa. Los programas de ViiVConnect no constituyen un seguro de salud.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Problemas hepáticos.** Las personas con antecedentes del virus de la hepatitis B o C, o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. También han ocurrido problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, similar al color del té; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

MÁS INFORMACIÓN

"Tengo ese contacto regular con mi equipo médico, así que he construido una relación dinámica y continua".

Steve
Excursionista
Viajero apasionado
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si tienes alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

Continuando la conversación sobre CABENUVA

Aquí hay algunas preguntas que tal vez tengas:

P. ***¿Cómo logra CABENUVA ayudar a mantenerme indetectable?***

R. CABENUVA combina 2 medicinas para el VIH que controlan el virus de diferentes maneras. Estas medicinas son de acción prolongada, por lo que se pueden administrar una vez al mes o cada dos meses.

P. ***¿Qué pasa si no cumplo con mi inyección de CABENUVA?***

R. Si no cumples o planeas no cumplir con tu cita de tratamiento por más de 7 días, comunícate con tu médico de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento para asegurarte de mantenerte indetectable.

P. ***¿Puedo cambiar la frecuencia de mi dosis si ya recibo CABENUVA?***

R. Si ya recibes CABENUVA, es posible que puedas cambiar la frecuencia de tus dosis, ya sea a inyecciones cada dos meses o una vez al mes. La mejor manera de averiguarlo es preguntándole a tu médico; él puede aconsejarte sobre los pasos que deberás seguir.

Continúa en la siguiente página

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección; fiebre; cansancio; dolor de cabeza; dolor en los músculos o huesos; náuseas; problemas para dormir; mareo; erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

Continuando la conversación sobre CABENUVA

P. ***¿Qué puedo hacer para ayudar a tratar las reacciones en el lugar de la inyección?***

R. En los estudios clínicos, las reacciones en el lugar de la inyección* fueron comunes y la mayoría fueron de leves a moderadas. Pregúntale a tu médico qué puedes hacer para ayudar a tratar los síntomas como el dolor o la irritación que puedes experimentar por las inyecciones.

*Las reacciones en el lugar de la inyección incluyen dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección.

P. ***¿Hay interacciones entre otros medicamentos y CABENUVA?***

R. Algunos medicamentos podrían interactuar con CABENUVA, así que asegúrate de informar a tu médico sobre todos los medicamentos que estés tomando. Esto incluye todos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales. No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu médico.

P. ***¿Cuándo puedo empezar con mi tratamiento de acción prolongada?***

R. Antes de recibir tus primeras inyecciones, podrías tomar alrededor de un mes de pastillas de inicio para ver cómo reacciona tu cuerpo. Tu primera y segunda inyección serán con un mes de diferencia. Después de eso, comenzarás tu tratamiento una vez al mes o cada dos meses.

Continúa en la siguiente página

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad. Haz clic para ver los Datos Importantes sobre CABENUVA.

ATRÁS | CONTINUAR

Continuando la conversación sobre CABENUVA

P. ***Si me recetan pastillas de inicio, ¿qué debo hacer antes de comenzar a tomarlas?***

R. Debes comunicarte con el consultorio de tu médico para confirmar:
- El día de tu primera cita para recibir tus inyecciones. De ahí en adelante, este será tu Día de Tratamiento Planeado
- El día en el que debes dejar de tomar tu tratamiento actual para el VIH
- El día en el que debes comenzar las pastillas de inicio

P. ***¿Cómo se envían las pastillas de inicio?***

R. Las pastillas de inicio se entregan en un Paquete de Bienvenida en donde quieras, como en tu casa o el consultorio de tu médico.

P. ***¿Cuáles son los costos de CABENUVA y cuánto pagaré?***

R. Los costos son por el tratamiento en sí y las citas médicas. La cantidad que pagas de tu bolsillo depende de la cobertura de tu seguro y de si calificas para algún programa que pueda reducir los gastos que pagas de tu bolsillo.

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir CABENUVA (continúa)

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si: (continúa)
- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. **No amamantes si estás usando CABENUVA.** No debes amamantar si tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle el VIH 1 a tu bebé. Se desconoce si CABENUVA puede pasar al bebé a través de la leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé durante el tratamiento.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Visita es.CABENUVA.com

Conoce historias reales, encuentra recursos, obtén respuestas a preguntas frecuentes y más

Te recomendamos que reportes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Lee la Información para el Paciente de CABENUVA y coméntala con tu proveedor de salud.

Trademarks are property of their respective owners.

ViiV Healthcare

©2022 ViiV Healthcare or licensor.
CBROGM220066_SPAN June 2022
Produced in USA.

CABENUVA

cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Datos Importantes sobre CABENUVA

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre CABENUVA y no remplaza la conversación con tu proveedor de salud sobre tu condición médica y tu tratamiento.

(Ca-be-NU-va)

ACERCA DE CABENUVA

CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar la infección por VIH 1 en personas de 12 años de edad en adelante que pesan al menos 77 libras (35 kg) con el fin de remplazar su medicamento actual para el VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.

El VIH 1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

CABENUVA contiene 2 medicinas diferentes:

- cabotegravir
- rilpivirine

Se desconoce si CABENUVA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad o que pesen menos de 77 libras (35 kg).

NO RECIBAS CABENUVA SI

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Estás tomando las siguientes medicinas:
  - carbamazepine
  - oxcarbazepine
  - phenobarbital
  - phenytoin
  - rifabutin
  - rifampin
  - rifapentine
  - dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis)
  - hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)

ANTES DE RECIBIR CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.
- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. **No amamantes si estás usando CABENUVA.**
  - No debes amamantar si tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle el VIH 1 a tu bebé. Se desconoce si CABENUVA puede pasar al bebé a través de la leche materna.
  - Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé durante el tratamiento con CABENUVA.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos herbales. Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico cuando compres un nuevo medicamento. Puedes pedirle a tu proveedor de salud o farmacéutico la lista de los medicamentos que interactúan con CABENUVA.

No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud. Tu proveedor de salud puede decirte si es seguro tomar CABENUVA con otros medicamentos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE CABENUVA

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:**
  - fiebre
  - sensación de malestar general
  - cansancio
  - dolores musculares o en las articulaciones
  - dificultad para respirar
  - ampollas o úlceras en la boca
  - ampollas
  - enrojecimiento o hinchazón de los ojos
  - hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen unos minutos después de la inyección. Los síntomas pueden incluir:
  - dificultad para respirar
  - estrechamiento de las vías respiratorias
  - calambres estomacales
  - sudoración
  - adormecimiento de la boca
  - dolor (p. ej., espalda y pecho)
  - sensación de ansiedad
  - sensación de calor
  - sarpullido
  - sensación de aturdimiento o sensación de que te vas a desmayar
  - cambios en la presión arterial
- **Problemas hepáticos.** Las personas con antecedentes del virus de la hepatitis B o C o las personas que tienen determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. También han ocurrido problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:**
  - color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia)
  - orina oscura, similar al color del té
  - deposiciones (heces) de color claro
  - náuseas o vómitos
  - pérdida del apetito
  - dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago
  - picazón

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Datos Importantes sobre CABENUVA (continuación)

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre CABENUVA y no remplaza la conversación con tu proveedor de salud sobre tu condición médica y tu tratamiento.

(Ca-be-NU-va)

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE CABENUVA (CONTINUACIÓN)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continuación)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si tienes alguno de los siguientes síntomas:**
  - tristeza o desesperanza
  - ansiedad o inquietud
  - piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, hematomas y calor en el lugar de la inyección
- fiebre
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor en los músculos o huesos
- náuseas
- problemas para dormir
- mareo
- erupción cutánea

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

- Habla con tu proveedor de salud o farmacéutico.
- Visita es.CABENUVA.com o llama al 1-877-844-8872, donde también puedes obtener las indicaciones de uso del producto aprobadas por la FDA.

March 2022 CBN:4PIL
Trademarks are property of their respective owners.
©2022 ViiV Healthcare or licensor.
CBROGM220066_SPAN June 2022
Produced in USA.

CABENUVA

cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

(kab' en ue vah)

Important Facts About CABENUVA

This is only a brief summary of important information about CABENUVA and does not replace talking to your healthcare provider about your condition and treatment.

ABOUT CABENUVA

CABENUVA is a complete prescription regimen used to treat HIV-1 infection in people 12 years and older who weigh at least 77 lbs (35 kg), to replace their current HIV-1 medicines when their healthcare provider determines that they meet certain requirements.

HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

CABENUVA contains 2 different medicines:

- cabotegravir
- rilpivirine

It is not known if CABENUVA is safe and effective in children younger than 12 years of age or weighing less than 77 lbs (35 kg).

DO NOT RECEIVE CABENUVA IF YOU

- have ever had an allergic reaction to cabotegravir or rilpivirine.
- are taking the following medicines:
  - carbamazepine
  - oxcarbazepine
  - phenobarbital
  - phenytoin
  - rifabutin
  - rifampin
  - rifapentine
  - dexamethasone (more than a single-dose treatment)
  - St John's wort (*Hypericum perforatum*)

BEFORE RECEIVING CABENUVA

Tell your healthcare provider about all your medical conditions, including if you:

- have ever had a skin rash or an allergic reaction to medicines that contain cabotegravir or rilpivirine.
- have ever had liver problems, including hepatitis B or C infection.
- have ever had mental health problems.
- are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if CABENUVA will harm your unborn baby. CABENUVA can remain in your body for up to 12 months or longer after the last injection.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. **Do not breastfeed if you take CABENUVA.**
  - You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing HIV-1 to your baby. It is not known if CABENUVA can pass to your baby in your breast milk.
  - Talk with your healthcare provider about the best way to feed your baby during treatment with CABENUVA.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements. Some medicines interact with CABENUVA. Keep a list of your medicines and show it to your healthcare provider and pharmacist when you get a new medicine. You can ask your healthcare provider or pharmacist for a list of medicines that interact with CABENUVA.

Do not start taking a new medicine without telling your healthcare provider. Your healthcare provider can tell you if it is safe to take CABENUVA with other medicines.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF CABENUVA

CABENUVA may cause serious side effects, including:

- **Allergic reactions.** Call your healthcare provider right away if you develop a rash with CABENUVA. **Stop receiving CABENUVA and get medical help right away if you develop a rash with any of the following signs or symptoms:**
  - fever
  - generally ill feeling
  - tiredness
  - muscle or joint aches
  - trouble breathing
  - blisters or sores in mouth
  - blisters
  - redness or swelling of the eyes
  - swelling of the mouth, face, lips, or tongue
- **Post-injection reactions** have happened within minutes in some people after receiving their rilpivirine injection. Most symptoms resolved within minutes after the injection. Symptoms may include:
  - trouble breathing
  - narrowing of airways
  - stomach cramps
  - sweating
  - numbness of your mouth
  - pain (e.g., back and chest)
  - feeling anxious
  - feeling warm
  - rash
  - feeling light-headed or feeling like you are going to pass out (faint)
  - blood pressure changes
- **Liver problems.** People with a history of hepatitis B or C virus or people who have certain liver function test changes may have an increased risk of developing new or worsening changes in certain liver tests during CABENUVA treatment. Liver problems have also happened in people without history of liver problems or other risk factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver function. **Call your healthcare provider right away if you develop any of the following signs or symptoms of liver problems:**
  - your skin or the white part of your eyes turns yellow (jaundice)
  - dark or "tea-colored" urine
  - light-colored stools (bowel movements)
  - nausea or vomiting
  - loss of appetite
  - pain, aching, or tenderness on the right side of your stomach area
  - itching
- **Depression or mood changes. Call your healthcare provider or get emergency medical help right away if you have any of the following symptoms:**
  - feeling sad or hopeless
  - feeling anxious or restless
  - have thoughts of hurting yourself (suicide) or have tried to hurt yourself

The most common side effects of CABENUVA include:

- pain, tenderness, hardened mass or lump, swelling, redness, itching, bruising, and warmth at the injection site
- fever
- tiredness
- headache
- muscle or bone pain
- nausea
- sleep problems
- dizziness
- rash

These are not all the possible side effects of CABENUVA. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION

- Talk to your healthcare provider or pharmacist.
- Go to CABENUVA.com or call 1-877-844-8872, where you can also get FDA-approved labeling.

March 2022 CBN:4PIL
Trademarks are property of their respective owners.
©2022 ViiV Healthcare or licensor.
CBROGM220066 June 2022
Produced in USA.